

Subtrib. II. **Amsinckieae.**

*Amsinckieae* Brand, nov. subtrib. — Cotyledones bipartitae. — Genus unicum.

33. **Amsinckia** Lehm.

*Amsinckia*\*) Lehm. Del. sem. hort. Hamburg (1831) 7; DC. Prodr. X. (1846) 447; Benth. et Hook. f. Gen. II. (1876) 848; A. Gray, Syn. Fl. II. 1. (1878) 497; Baill. Hist. pl. X. (1891) 376; Gürke in Engl. u. Prantl, Pflzfam. IV. 3 a. (1893) 440; Dalla Torre et Harms, Gen. Siphon. (1904) 427; Macbride in Contr. Gray Herb. n. ser. XLIX. (1917) 4. — *Benthamia* Post et O. Ktze. Lexicon (1904) 65.

Calyx usque ad basin partitus. Corolla lutea cylindrica vel hypocrateriformis vel tubiformis calyce semper fere longior, limbo tubo multo brevior. Fornices nulli. Stamina tubo corollae inserta inclusa. Stylus filiformis plerumque elongatus; stigma simplex capitatum. Gynobasis conica apice obtusa 4 excavationibus triangularibus vel orbicularibus, raro elevationibus linearibus ornata. Nuculae 4 facie interiore carinatae, raro sulcatae; cicatrix basalis vel supra-basalis. — Herbae annuae hispidae, foliis alternis, cincinnis plerumque ebracteatis.

Species 41 Americam pacificam inhabitantes.

## Systema generis.

- A. Corolla apice clausa cleistogama. . . . . Sect. 1. **Cryptanthoides.**  
 B. Corolla aperta chasmogama.  
 a. Gynobasis excavationibus ornata. . . . . Sect. 2. **Euamsinckia.**  
 b. Gynobasis elevationibus ornata . . . . . Sect. 3. **Amsinckiella.**

Sect. 1. **Cryptanthoides** Brand.

*Cryptanthoides* Brand, nov. sect. — Species unica.

1. **A. Mandonii** (Ball) Brand, nov. nom. — *Eritrichium Mandonii* Ball! in Journ. Linn. Soc. XXII. (1885) 54. — Hispidissima erecta a basi ramosa, 30—40 cm alta. Folia lineari-lanceolata, usque ad 20 cm longa, 15—30 mm lata, basi quasi in petiolum alatum longe et sensim attenuata apice acuta. Cincinni ebracteati breves sed densissimi, floribus subsessilibus fructibus breviter pedicellatis; sepala linearia 3 mm longa; corolla cylindrica calycem haud superans; fornices nulli; calyx fructifer 5 mm longus. Nuculae brunneae late ovoideae 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> mm longae utrinque corrugatae et granulatae, haud rugosae, facie interiore elevatim carinatae.

Bolivia: Auf Brachfeldern in der Nähe des Sorata, 2700—2900 m ü. M. (Mandon n. 378).

Sect. 2. **Euamsinckia** Brand.

*Euamsinckia* Brand, nov. sect. — Nuculae facie interiore carinatae.

- A. Sepala partim coalita.  
 a. Nuculae maturae nigrae.  
 α. Corolla 5 mm longa. . . . . 2. *A. maritima.*  
 β. Corolla 9—10 mm longa. . . . . 3. *A. nigricans.*  
 b. Nuculae maturae brunneae.  
 α. Corolla calyce duplo vel triplo longior.  
 I. Corolla 8 mm longa . . . . . 4. *A. Sancti Nicolai.*  
 II. Corolla 15—18 mm longa . . . . . 5. *A. Lemmonii.*  
 β. Corolla calyce paulo longior . . . . . 6. *A. tessellata.*

\*) »Nach Wilhelm Amsinck, Bürgermeister von Hamburg, Freund der Botanik und großmütigem Unterstützer des Bot. Gartens daselbst. Vgl. Memoriam Guil. Amsinckii civibus commendat Lehmann Hamburg 1833.« (Wittstein, Etym. bot. Handwörterbuch [1852] 41).