

Asclepias africana aizoides, flore pulchre fimbriato.
Comm. rar. 19. t. 19.
Habitat ad Cap. b. Spei. b

HERNIARIA.

glabra.

1. **HERNIARIA glabra.** *Bauh. hist. 3. p. 378.*
Herniaria calycibus bractea nudis. Hort. cliff. 41. Fl.
suec. 207. Mat. med. 104. Roy. lugdb. 215. Hall.
helv. 182. Dalib. paris. 76.
Polygonum minus f. Millagrana major. Bauh. pin. 281.
Habitat in Europæ apricis, glareosis, siccis. ☉

hirsuta.

2. **HERNIARIA hirsuta.** *Bauh. hist. 3. p. 379.*
Habitat in Angliæ, Hispaniæ, Italiæ agris.

lenticulata.

3. **HERNIARIA?** quæ *Polygonum lenticulatum.*
Polygonum minus tenuifolium. Bauh. pin. 281.
Polygonum minus lentifolium. Bauh. prodr. 131.
Habitat in Hispaniæ montibus Escurial, Monspelii.
Flores non vidi; ut excitem Botanicos ad hujus generis
forte distinctissimi examen, hic plantam adjeci; Habi-
tus proximus herniariæ, sed mollissimus.

CHENOPODIUM.

* *foliis angulosis.*Bonus Hen-
ricus.

1. **CHENOPODIUM** foliis triangulari-sagittatis integer-
 rimis. *Hort. cliff. 84. Fl. suec. 208. Mat. med. 106.*
Roy. lugdb. 278. Hall. helv. 174. Dalib. paris. 79.
Lapathum unctuosum. Bauh pin. 115
Bonus Henricus. Bauh. hist. 2. p. 965.
Habitat in Europæ ruderatis. ♀

urbicum.

2. **CHENOPODIUM** foliis triangularibus subdentatis,
 racemis confertis strictissimis cauli approximatis lon-
 gissimis. *Fl. suec. 209.*
Chenopodium latifolium minus ramosum, petiolis lon-
gissimis ex foliorum alis confertim nascentibus. Buxb.
ball. 69. t. 1.
Habitat in Europæ borealis plateis. ☉

rubrum.

3. **CHENOPODIUM** foliis cordato-triangularibus ob-
 tusiusculis dentatis, racemis erectis compositis subnu-
 dis caule brevioribus. *Fl. suec. 210. Mat. med. 107.*
Dalib. paris. 78.
Chenopodium erectum, foliis subtriangularibus antice si-
nuato-dentatis, racemis erectis foliosis lateralibus.
Hort. cliff. 85. Roy. lugdb. 219. A.

Atriplex sylvestris latifolia. *Baub. pin.* 119.

Pes anserinus. *Dalech. hist.* 542. t. 542.

Habitat in Europæ cultis, ruderatis. ☉

4. CHENOPODIUM foliis ovatis acutis dentatis, racem^{murale,}is ramosis nudis. *Fl. suec.* 211. *Dalib. paris.* 211.

Chenopodium erectum ramosissimum, foliis triangularibus dentatis, racemis ramosis caulem superantibus. *Hort. cliff.* 85. *Lech. scan.* 16.

Habitat in Europæ muris aggeribusque. ☉

5. CHENOPODIUM foliis rhomboideo-triangulari^{album.}bus erosis postice integris; summis oblongis, racemis erectis. *Fl. suec.* 212. *Dalib. paris.* 80.

Chenopodium foliis inferioribus ovatis acutis antrorsum dentatis; summis lanceolatis. *Vir. cliff.* 22. *Hort. cliff.* 85. *Gron. virg.* 145. *Roy. lugdb.* 219. *Hall. belv.* 175.

Habitat in agris Europæ. ☉

6. CHENOPODIUM foliis rhomboideis dentato-sinuatis^{viride.}, racemis ramosis subnudis. *Fl. suec.* 213. *Dalib. paris.* 78.

Chenopodium sylvestre, opuli folio. *Vaill. paris.* 36. t. 7. f. 1.

Chenopodium folio oblongo integro. *Dill. app.* 62.

Habitat in Europæ cultis oleraceis.

7. CHENOPODIUM foliis cordatis angulato-acuminatis^{hybridum.}, racemis ramosis nudis. *Fl. suec.* 214. *Dalib. paris.* 79.

Chenopodium foliis triangulari-sagittatis; infra medium sinuato-dentatis, racemis longissimis. *Hort. cliff.* 84. *Roy. lugdb.* 219.

Chenopodium stramonii folio. *Vaill. paris.* 36. t. 7. f. 2.

Atriplex sylvestris latifolia, acutiore folio. *Baub. pin.* 119.

Habitat in Europæ cultis. ☉

8. CHENOPODIUM foliis oblongis sinuatis, racemis *Botrys,* nudis multifidis. *Hort. cliff.* 84. *Hort. ups.* 55. *Mat. med.* 109. *Roy. lugdb.* 219. *Sauv. monsp.* 273.

Botrys ambrosioides vulgaris. *Baub. pin.* 138.

Botrys. *Dod. pempt.* 34.

Habitat in Europæ australis arenosis. ☉

9. CHENOPODIUM foliis lanceolatis dentatis, racem^{ambrosioides.}is

mis foliatis simplicibus. *Hort. cliff.* 84. *Hort. ups.* 56. *Roy. lugdb.* 219.

Botrys ambrosioides mexicana. *Baub. pin.* 138. 516.

Botrys odorata suaveolens americana mexicana. *Morif. hist.* 2. p. 605. f. 5. t. 35. f. 8.

Habitat in Mexico, Lusitania. ☉

multifidum. 10. CHENOPODIUM foliis multifidis: segmentis linearibus, floribus axillaribus sessilibus.

Chenopodium sempervirens, foliis tenuiter laciniatis.

Dill. elth. 78. t. 66. f. 77.

Habitat in Bonaria. ☽

anthelminticum. 11. CHENOPODIUM foliis ovato-oblongis dentatis, racemis aphyllis.

Chenopodium, lycopi folio, perenne. *Dill. elth.* 77. t. 66. f. 76.

Habitat in Pensylvania, Bonaria. ☽

glaucum, 12. CHENOPODIUM foliis ovato-oblongis repandis, racemis nudis simplicibus glomeratis *Fl. suec.* 215. *Dalib. paris.* 77.

Chenopodium foliis ovato oblongis repandis sinuatis, florum racemis glomeratis ex ala solitariis. *Vir. cliff.* 22. *Hort. cliff.* 85. *Roy. lugdb.* 219.

Chenopodium angustifolium laciniatum minus. *Tournef. inst.* 506.

Habitat ad Europæ fimeta. ☉

* * foliis integris.

Vulvaria. 13. CHENOPODIUM foliis integerrimis rhombeo-ovatis, floribus conglomeratis. *Fl. suec.* 216. *Mat. med.* 108. *Dalib. paris.* 77.

Chenopodium foliis triangulari-ovatis. *Hort. cliff.* 84. *Roy. lugdb.* 218.

Atriplex foetida. *Baub. pin.* 119.

Vulvaria. *Dalech. hist.* 543.

Habitat in Europæ cultis oleraceis, ☉

polyspermum 14. CHENOPODIUM foliis integerrimis ovatis, caule decumbente, cymis dichotomis.

Chenopodium foliis ovatis integerrimis, caule decumbente. *Vir. cliff.* 21. *Fl. suec.* 217. *Roy. lugdb.* 218.

Dalib. paris. 77.

Blitum foliis ovatis. *Hort. cliff.* 28.

Blitum polyspermum. *Baub. pin.* 118.

Polyспорon cassiani, bassii, anguillare. *Lob. hist.* 128.

Habitat in Europæ cultis. ☉

15. CHENOPODIUM foliis lineari-lanceolatis planis *Scoparia*, integerrimis. *Hort. cliff.* 86. *Hort. ups.* 55. *Roy. lugdb.* 220.
Linaria scoparia. Baub. pin. 212.
Osyris. Dod. pempt. 151.
Habitat in Græcia, Japonia. ☉
16. CHENOPODIUM foliis subulatis semicylindricis. *maritimum*.
Chenopodium foliis subulatis; superne planis, subtus convexis. Hort. cliff. 86. *Fl. suec.* 218. *Roy. lugdb.* 220.
Kali minus album, semine splendente. Baub. pin. 289.
Moris. hist. 2. p. 610. s. 5. t. 33. f. 3.
Habitat in Europæ maritimis.
17. CHENOPODIUM foliis linearibus teretibus carno- *fruticosum*,
 fis, caule fruticoso. *Hort. cliff.* 86. *Roy. lugdb.* 220.
Gætt. stamp. 2. p. 425. *Sauv. monsp.* 7.
Chenopodium, sedi folio minimo, frutescens perenne.
Boerb. lugdb. 2. p. 91.
Sedum minus arborescens. Munt. hist. t. 469.
Habitat in Galliæ, Hispaniæ maritimis. †
18. CHENOPODIUM foliis filiformibus acutiusculis, *altissimum*,
 caule erecto. *Hort. ups.* 55.
Chenopodium altissimum, foliis succulentis. Buxb. cent.
I. p. 21. t. 31. f. 2.
Kali gramineo folio. Baub. pin. 289. *prodr.* 133. *Burs.*
XVI: 20.
- β. *Chenopodium foliis filiformibus inermibus mucronatis,*
caule ramosissimo. Hort. ups. 56.
Habitat ad Astracatum, ad salinas saxonicas inque Italia.
19. CHENOPODIUM foliis linearibus obtusis: subtus *salsum*,
 convexis, caule ramofo: ramis deflexis. *Hort. ups.* 55.
Chenopodium maritimum, foliis sedi teretibus. Buxb.
cent. I. p. 21. t. 31. f. 1.
Habitat ad Astracatum. ☉
20. CHENOPODIUM foliis teretibus obtusis tomento- *hirsutum*,
 sis alternis, caule herbaceo. *Sauv. monsp.* 7.
Kali minus villosum. Baub. pin. 289. *prodr.* 133.
Kali parvum hirsutum. Baub. hist. 702.
Habitat Monspeli in maritimis.
21. CHENOPODIUM foliis lanceolatis carnosis, co- *aristatum*,
 rymbis dichotomis spinosis.
Habitat in Sibiria. ☉

Caulis *spithameus, inequalis, ramoso-patulus*. Folia *car-
nosa, lanceolata, obtusa*. Corymbi *axillares, dichoto-
mi, folio longiores, terminati spinis inermibus*. Flores
sessiles in divaricationibus.

virginicum. 22. CHENOPODIUM foliis linearibus obtusis subca-
naliculatis, pedunculis axillaribus, dichotomis muticis.
Habitat in Virginia? ☉

BETA.

- vulgaris*. i BETA. *Hort. cliff. 83. Hort. ups. 56. Mat. med.
113. Roy. lugdb. 220.*
- perennis
tubra*. Beta sylvestris maritima. *Bauh. pin. 118.*
- β. Beta rubra vulgaris. *Bauh. pin. 118.*
- γ. Beta rubra major. *Bauh. pin. 118.*
- δ. Beta rubra, radice rapæ. *Bauh. pin. 118.*
- ε. Beta lutea major. *Bauh. pin. 118.*
- ζ. Beta pallide virens major. *Bauh. pin. 118.*
- Cicla*. η. Beta alba vel pallefcens, quæ Cicla officinarum. *Bauh.
pin. 118.*
- θ. Beta communis viridis. *Bauh. pin. 118.*
Habitat in Angliæ & Belgii litoribus maris. ♂

SALSOLA.

- kali*. i. SALSOLA herbacea, foliis subulatis mucronatis, ca-
lycibus ovatis axillaribus.
Salsola foliis pungentibus. *Hort. cliff. 86. Fl. suet.
206. Roy. lugdb. 220. Gron. virg. 28,*
Kali spinosum cochleatum. *Bauh. pin. 289.*
Kali spinoso affinis. *Bauh. pin. 289. Moris. hist. 2. f.
5: t. 33: f. 11.*
Habitat in Europæ litoribus maris. ☉
- rosacea*. 2. SALSOLA herbacea, foliis subulatis mucronatis, ca-
lycibus explanatis.
Salsola foliis conico-subulatis mucronatis, calycibus co-
rolliformibus obtusis coloratis crenatis. *Hort. ups. 56.*
Kali humile, alis purpureis florem rosaceum mentientibus.
Buxb. cent. 1. p. 9: t. 14. f. 2.
Habitat ad Asiæ septentrionalis salinas. ☉
- prostrata*. 3. SALSOLA frutescens, foliis linearibus pilosis inermi-
bus. *Amœn. acad. 2. p. 346. **
Habitat in Asia boreali, Virginia. ♂