

strigosa erecta simplex vel parce ramosa 10—30 cm alta. Folia lineari-ensifolia stricta strigosa, distincte uninervia, 40—50 mm longa, 2—3 mm lata. Cincinni terminales, in statu florifero breves et densi ebracteati, floribus fructibusque sessilibus; sepala linearia, $2\frac{3}{4}$ mm longa dense ciliata et remote setosa; corolla infundibuliformis $4\frac{1}{4}$ mm longa, limbo magno 5—6 mm diametro; fornices semilunares; gynobasis anguste pyramidalis cum stylo paulo brevior calyce fructifero 5 mm longo sesquibrevior. Nuculae 4 conformes lanceolatae $2\frac{1}{2}$ —3 mm longae brunneae haud nitentes; sulcus angustus basi vix dilatatus.

Californien: Santa Clara County: San José. Monterey County (nach Greene). San Luis Obispo County (M. M. Miles, 1886, ex herb. Christ in Herb. Berlin).

86. *C. grandiflora* Rydberg! in Bull. Torr. Bot. Club XXXVI. (1909) 679. — *C. Torreyana* var. *grandiflora* Nelson et Macbride in Bot. Gaz. LXI. (1916) 43. — *C. Hendersonii* Johnston l. c. 75, ex parte. — Annuā pilis longis hispidissima. Caulis erectus simplex vel ramosus 8—40 cm altus. Folia late linearia, 20—50(—60) mm longa, 2—7(—9) mm lata, uninervia. Cincinni terminales multiflori laxi ebracteati, floribus fructibusque sessilibus; sepala subulata 3 mm longa; corolla subrotata, tubus limbo duplo brevior; fornices oculiformes; gynobasis pyramidalis cum stylo brevi calyce fructifero 5 mm longo plus duplo brevior. Nuculae solitariae vel binae flavido-brunneae nitentes ovoideo-acutae 3 mm longae; sulcus angustissimus, basi furcatus.

Idaho: Tal des Clearwater River, Nez Percés County (Sandberg, Mc Dougal, Heller n. 40). — Blüht im April.

Var. *anulata* Brand, nov. var. — Nuculae 4, 2 mm longae. Fornices anuliformes.

Washington: Whitman County: Pullman, sehr gemein in Dickichten an Fluß-ufem (Elmer n. 156 in Herb. Berlin). — Blüht im Mai.

87. *C. rostellata* Greene in Pittonia I. (1887) 116; Johnston in Contr. Gray Herb. n. ser. LXXIV. (1925) 97. — *Krynitzkia rostellata* Greene in Bull. Calif. Acad. Sci. I. (1885) 203. — Annuā hispida parce ramosa 10—20 cm alta. Folia inferiora et media opposita, 10—15 mm longa, 2—3 mm lata. Cincinni ebracteati 2—4 cm longi; corolla $\frac{1}{2}$ —1 mm lata; calyx fructifer 3—4 mm longus. Nuculae solitariae compressae ovato-lanceolatae vel lanceolatae 2—3 mm longae; sulcus clausus, sed basi distincte dilatatus.

Californien: Im Sacramento-Tale (nach Johnston). — Nicht gesehen.

Var. *Suksdorfii* (Greene) Brand, nov. comb. — *Krynitzkia Suksdorfii* Greene! in Bot. Gaz. XL. (1905) 146. — *C. Suksdorfii* Piper! Fl. Washington (1906) 484. — *C. rostellata* Johnston l. c., ex parte. — Humilis simplex 4—15 cm alta. Folia 10—22 mm longa, 1—2 mm lata; sepala lineari-lanceolata $2\frac{3}{4}$ mm longa; corolla infundibuliformis 3 mm longa, $2\frac{1}{4}$ mm lata; fornices nulli; gynobasis brevissima subulata cum stylo brevissimo calyce fructifero 4 mm longo quadruplo brevior. — An species propria?

Washington: Klickitat County: felsige Hügel bei Rockland (Suksdorf n. 2346). — Blüht im April. — Wahrscheinlich gehören zu dieser Varietät auch die von Johnston für Oregon angegebenen Specimina von *C. rostellata*: bei Dalles City und Grizzly Butte.

88. *C. Mariposae* J. M. Johnston! in Contr. Gray Herb. n. ser. LXXIV. (1925) 73. — Annuā tenuissima simplex hispido-strigosa 5—10 cm alta. Folia inferiora opposita ca. 7 cm longa, ca. 1 mm lata. Cincinni axillares et terminales breves ebracteati, floribus fructibusque sessilibus; sepala linearia 2 mm longa; corolla infundibuliformis $3\frac{1}{2}$ mm longa, $2\frac{1}{2}$ mm (3—6 mm ex Johnston) lata; gynobasis pyramidalis cum stylo brevi calyce fructifero 5 mm longo triplo brevior. Nuculae solitariae vel binae lanceolatae 2 mm longae apice valde attenuatae dilute brunneae laeves (saepae granulatae, ex Johnston); sulcus angustissimus basi divaricato-furcatus.

Californien: Mariposa (Congdon, 27. April 1898, Herb. Gray).

89. *C. sparsiflora* Greene in Pittonia I. (1887) 116; Johnston l. c. 100. — *Krynitzkia sparsiflora* Greene in Bull. Calif. Acad. Sci. I. (1885) 203; A. Gray, Syn. Fl. II. 1. Suppl. (1886) 425. — Annuā gracillima parce ramosa disperse strigosa 10—30 cm alta. Folia inferiora opposita anguste linearia, 10—30 mm longa, ca. 1 mm lata. Cincinni graciles basi parce bracteati; corolla vix 1 mm lata; calyx fructifer 2—3 mm