

pere diverso; ab *E. capituliflоро*, caule fruticoso, floribus magnis etc.

332. Eritrichium cynoglossoides Ph. E. perenne, incanum, humile; caule pilis appressis vestito, basi ramoso; ramis simplicibus; foliis linearibus, inferioribus basi valde attenuatis, superioribus latioribus, oblongis, omnibus albo-hispidis; floribus ad apices ramorum in capitula congestis; calyce fulvo-lanato, corollis magnis.

In herb. Chilensi cum *E. capituliflоро* confusum jacebat, ut videtur prope *Arqueros* lectum. — Caulis 5 pell. longus; folia inferiora 10 lin. longa, 1 lin. lata, superiora 5 lin. longa, $1\frac{1}{2}$ lin. lata; calyx fere $1\frac{1}{2}$ lin. longus, diam. corollae $1\frac{2}{3}$ — 2 lin. — Differt ab *E. capituliflоро* foliis superioribus basi latioribus, fere amplexicaulis, calyce corollaque duplo majoribus, vellere calycino breviore, magis rigido.

333. Eritrichium asperum Ph. E. annum, ramosum; caule pilis brevibus, patentibus hirsuto; foliis linearibus, albo-verrucosis; racemis elongatis, multioris; calycis parvi tubo setis brevibus aspero, setis in basi laciniarum linearium obtusaram longioribus; corolla satis minuta.

Prope portum *Coquimbo* legi. — Caulis pedalis, folia 9 — 10 lin. longa, $1\frac{1}{4}$ lin. lata; calyx vix $1\frac{1}{4}$ lin. longus, diameter corollae vix $1\frac{1}{2}$ lin.; achaenia minima, pallide fusca, vix tuberculata, punctata. — Ab *E. globulifero* caule haud à basi ramosissimo, calyce minime pilis longis horizontalibus tecto, verrucis albis foliorum, ab *E. subamplexicauli* mihi (Flor. atacam.) foliis superioribus basi haud dilatatis, pilis caulinis brevioribus, calyce floribusque longe minoribus etc. differt.