

das en el dorso i granulosas.—Se distingue a primera vista de la especie antecedente por las hojas cortas; las espigas paucifloras, del *E. filiforme* por la pubescencia i las mismas espigas paucifloras.

36. ERITRICHIMUM MACROCALYX.—Ph.

E. annuum, pauciramosum, modice setosum; radice simplici, rubra; foliis linearibus, inferius confertis; racemis brevissime pedunculatis, paucifloris, floribus confertis, etiam in maturitate, subsessilibus; calyce *magno*, in fructu 5 mm. longo, *egregie costato*, luteo-viridi, *setis brevibus* teneribus hispido; corollis minutis.

Prope Caldera Septembri 1885 lectum.

El mas grande de mis dos ejemplares tiene la altura de 20 centímetros, la raiz tiene el grosor de 2 milímetros, el tallo de 2½ milímetros. Las hojas inferiores han desaparecido, las siguientes tienen la longitud de 20 milímetros i la anchura de 4 milímetros, el pedúnculo comun de los racimos 13 milímetros; los racimos fructíferos son apénas mas largos. Las corolas son mui pequeñas i casi enteramente escondidas en el cáliz; su tubo es angosto. El cáliz es partido casi hasta la base. Los aqueños o nuececitas son de un color pardo mui oscuro, i muestran una costilla en el dorso; son lisos pero finamente puntuados.—No puede confundirse con ninguna otra especie.

37. ERITRICHIMUM FILAGINEUM.—Ph.

E. annuum, humile, erectum, a medio inde ramosum, ramis fastigiatis; caule *tenui*, 1 mm, crasso, pilis tenuioribus albis appressis, et interdum præterea setis tenuibus patentibus vestito; foliis *filiformibus*, patenter setosis; ramis plerumque *umbellatim trifurcatis*, ramis lateralibus iterum trifurcatis, medio spicam ab ima basi floriferam gerente, foliis ad originem umbellæ involucri speciem formantibus; calyce vix 3 mm. longo, setis flavis crassis hispido; corollis perparvis.

Inter Caldera et Copiapó legit filius, specimina tria, prope Caldera Borchers (specimina vix ramosa).