

pubescencia i las mismas flores pequeñas por los frutos basales del todo diferentes.

7. ERITRICHIUM GRACILE.—Ph.

*E. amphicarpum*; caule erecto, simplicissimo, gracili, apice in pedunculos aphyllis diviso, pilis appressis vestito, *primo adspectu glabro*; foliis linearifiliformibus, erectis, basalibus tempore florendi nullis; spicis conjugatis ternisve; calyce dense flavido-setoso; corolla minuta, diametro limbi 3 mm.

Hab. in prov. Talca.

La raíz es sencilla, del grueso de 2 milímetros así como el tallo i colorada. El tallo tiene la altura de 40 centímetros, i tiene tan poca vellosidad, que parece lampiño. Las hojas inferiores miden  $4\frac{1}{2}$  centímetros de largo i 1 milímetro de ancho, son cubiertas de pelos blancos recostados i llevan pestañas blancas bastante largas; las inferiores son adelgazadas en la base, las superiores sésiles en toda su anchura. Los ramos de la inflorescencia tienen el largo de 5 centímetros i llevan ya frutos maduros en su parte inferior. Los cálices de éstos miden casi 4 milímetros. En la base del tallo hai dos frutos aovados, con pico, su cáliz es cerrado i negro, del largo de 7 milímetros, contienen un solo aquenio desarrollado, igualmente aovado i con pico, mui liso i de color castaño. Las nuececitas de las flores superiores son blanquizcas, angulosas, i casi enteramente lisas.

8. ERITRICHIUM VIRENS.—Ph.

*E. annum?*, caule erecto, ramoso, virente sicut folia et cum iis setis patentibus hispido; foliis linearibus, superioribus basi latiore sessilibus; pedunculis communibus longe denudatis, plerumque trifidis; ramis brevibus, basi nudis; floribus pedicellatis; calyce setis flavis patentibus hispido; diametro limbi corollæ 3 mm.

Hab. in prov. Copiapó ad Chañarcillo.

He recibido solo la parte superior de la planta, que tiene la longitud de 20 centímetros, i está poblada de hojas únicamente en su parte inferior. Las hojas mayores miden 4 centímetros de

largo por 4 milímetros de ancho; la parte desnuda de los ramos de la inflorescencia hasta las primeras flores 20 milímetros, la que lleva las flores 10-15 milímetros, el cáliz 5 a 5½ milímetros.

9. ERITRICHIMUM DOLICHOPHYLLUM.—Ph.

E. annum, ramosum, albo-setosum, magis minusve canescens; caule folioso; foliis anguste linearibus longissimis, usque ad 10 cm, longis, modo 1½ mm. latis; pedunculis, jam nudis, jam foliatis, semel vel bis furcatis; ramis inflorescentiæ brevibus; calycibus flavo-setosis; corollis magnis, diametro limbi sc. 7 mm.

Habitat in prov. Coquimbo, l. d. Paihuano.

La raíz es delgada, del grosor de 1¼ milímetros, i de color pardo claro. El tallo alcanza a 25 centímetros de altura; es mas grueso que la raíz, mas o ménos ramificado, a veces casi en forma de césped; las cerdas albas, que lo cubren, son levantadas i bastante esparcidas. Las hojas muestran las mismas cerdas i pestañas mas largas. El pedúnculo comun es a veces trífido, pero por lo comun solo ahorquillado con ramos sencillos o bífidus. Las flores son casi sésiles i apretadas, el cáliz del largo de 4 milímetros. Ningun ejemplar está bastante desarrollado para mostrar frutos.

10. ERITRICHIMUM CEPHALANTHUM.—Ph.

E. caule perenne, inferiore crassiusculo, nigro, reliquis foliorum emortuorum nigris dense oblecto; ramis cæspitosis erectis, 5-8 cm. altis, *dense hirsutis*, pilis albis erectis; foliis linearibus, dense appresse hirsuto-setosis, basi longe ciliatis; floribus in capitula diametri 10-12 mm., luteo et setoso villosa dense congestis; corollis parvis, calyce inclusis.

Habitat.....

La parte inferior del tallo, que parece haber sido subterránea, tiene 4 milímetros de grueso i mas de 9 centímetros de largo, Las hojas en la base de los ramos son mui apretadas, largamente estrechadas en la base, redondeadas en el ápice, del largo