

Ethulia cónyzoides L.	Hippocrepis unisiliquosa L.	Loasa nitida Lam.	Nemophila peduncularis Dougl
Eupatorium paniculatum Schrd.	Hordeum jubatum L.	— palmata Sp. (Blumenbachia Schrd.)	— phacelioides Bart.
Farsetia eriocarpa D. C.	Hypocoum procumbens L.	Lobelia canariensis H. P.	Nepeta italica L.
Fedia gibbosa Guss.	Hyoscyamus canarensis Ker. ⑤	— inflata L.	— longiflora Vent.
— uucinata Stev.	— pusillus L.	Longchampia capillifolia W.	— multibracteata Desf.
— vesicaria Vahl.	Hypoxis villosa L.	Lophospermum scandens Don.	— multifida L. f.
Ferula nodiflora L.	Hyssopus discolor Desf.	Lotus diffusus Sm.	— reticulata Desf.
Festuca poaeformis Host.	— lophanthus L.	— edulis L.	Nicotiana alata H. Ber
— stipoides D. C.	— nepetoides L.	— hirsutus L.	— angustifolia R. Br. (acuminata Hook.)
— vaginata W. K.	Hyoseris scabra L.	— ornithopodoides L.	— glauca Hook.
Forskolea angustifolia Retz	Hypocharis hispida JV.	— pilosissimus Poir.	— micrantha H. Par.
— tenaciolima L.	Iberis Tenoreana D. C.	Lapinus bicolor B. R.	Nigella hispanica L.
— viridis Eb.	— amara L. fl. purpur.	— Crinkshankii B. M.	— orientalis L.
Fothergilla alnifolia L.	Impatiens parviflora D. C.	— hirsutus L.	Nolana paradoxa B. Reg.
Francoa sonchifolia Sp.	Imperatoria angustifolia Bell.	— micranthus Dougl.	Nonea alba D. C.
Frankenia pulverulenta L.	— palustris Bess.	— perennis L.	— lutea D. C.
Fritillaria pyrenaica L.	Inula arabica L.	— pilosus L.	— rosea M. B.
Galardia bicolor Lam.	— cespitosa Bl.	— polyphyllus Dougl.	Oenothera acanthis Cav.
Galium lucidum All.	— ensifolia L.	— nivea D. C.	— cheiranthifolia Horn.
— pedemontanum All.	— suaveolens Jacq.	Lychnis alpina L.	— decumbens B. R.
— valantioïdes M. B.	Ipomoea coccinea L.	— brachypetala Fisch.	— dentata Cav.
Garidella Nigellastrum L.	Ipomopsis elegans Mx.	— laeta H. K.	— fruticosa L.
Gastridium australe P. B.	Iris dichotoma Pall.	Lythrum hyssopifolium L.	— pumila L.
Gaura biennis L.	Isatis dasycarpa D. C.	Madia mellosa Jacq.	— roseo-alba Bh.
— tripetala Cav.	— latisiliqua Stev.	— viscosa Cav.	— tenella Cav.
Geranium aconitifolium Her.	Isolepis dichotoma Br.	Malcolmia littorea Br.	tetragona Ro.
— divaricatum E.	— prolifera Br.	— taraxacifolia D. C.	Obionea arenaria D. C.*
— ibericum Cav.	Iussia erecta L.	Malope trifida Cav.	— radiata D. C.
— lucidum L.	Kaulfussia ameloides N. E.	Malva microcalyx Bert.	Oldenlandia diffusa L.
— striatum L.	Kennedia prostrata Br.	— miniata Cav.	Omphalodes nitida Lm.
— sylvaticum L.	Kleinia suffruticosa H. Ber.	— Morenii Poll.	Ouronis breviflora D. C.
Gentiana asclepiadea L.	Koeleria glauca D. C.	— Tournefortiana L.	— Natrix L.
— lutea L.	— phleoides P. S.	— tricuspidata Br.	— pendula Desf.
Geum coccineum Sm.	Kriegia chilensis Bert.	Mandragora officinalis Bert	— rotundifolia L.
— pyrenaicum Bam.	Lagaseea mollis Cav.	Marica coelestis Lm.	Origanum pallidum Hort.
Gilia capitata Hook.	Lagoecia cuminoides L.	Marrubium cinereum Desf.	— virens Lk.
— eryngioides * ④)	Lagurus ovatus L.	— supinum L.	Oreithygium pyrenaicum L.
— inconspicua Hook.	Lapeyrouisia corymbosa Ker.	Matthiola tricuspidata D. C.	Orobus alpestris JV. K.
Gnaphalium chilense H. P.	Lappago racemosa Schrb.	Medicago sativa Ten.	— atropurpureus Desf.
— grandiflorum L.	Lactuca sagittata JV. K.	— brachycarpa Fisch.	— canescens L.
— resedifolium * ④)	— saligna L.	— carstiensis Jacq.	— tenuifolius Ro.
— spicatum Lam.	Laserpitium Archangelica Wulf.	— ciliaris W.	— variegatus Ten.
— squarrosum L.	— Silèr L.	— disciformis D. C.	Oxytropis ambigua D. C.
Gladiolus tristis L.	Lathyrus annuus L.	— laciniata L.	— glabra D. C.
Grahamia aromatica Hook.	— longepedunculatus Ldb.	— radiata L.	— pilosa D. C.
Gypsophila dichotoma Bess.	— pisiformis L.	— Teucriana Sp.	Papaver Bursari Cr.
— elegans M. B.	— setifolius L.	Melampodium paludosum Kth.	— croceum Ldb.
— stricta Ldb.	— sphaericus Bert.	Melilotus diffusa * ⑩)	— indica L.
— viscosa Murr.	— tingitanus L.	— parviflora Desf.	— obtusifolium Desf.
Hedysarum alpinum L.	Lasiospermum radiatum *	— taurica M. B.	— setigerum D. C.
— capitatum Desf.	Lavatera thuringiaca L.	Mesembryanthemum pomeridianum L.	Paronychia arabis D. C.
— obscurum L.	Lebretonia coccinea Schrk.	— tricolor W.	Passiflora albida H. Ber.
Helenium mexicanum Hort.	Leonurus sibiricus L.	Mespilus Chamaemespilus L.	Pastinaca Opopanax L.
— quadridentatum Lab.	— villosus Desf.	— Smithii D. G.	Parthenium luteum Sp.
Helianthus lenticularis Dougl.	Lepechinia spicata JV.	Melissa pyrenaica L.	Patrinia scabiosaefolia Fisch
— petiolaris Bart.	Lepidium cordatum JV.	Micropus erectus L.	Pattersonia glauca Br.
Helianthemum guttatum P. S.	— micranthum Mey.	— pygmaeus Desf.	Pavonia hastata Cav.
— niloticum P. S.	— spinosum L.	— supinus L.	Pentaphyllum Lupinaster Ldb. fl.
Heliotropium supinum L.	— subdentatum Burch.	Microtea debilis Sw.	alb. et purp.
Heliophila amplexicaulis L.	Lespedeza juncea Mx.	Milium paradoxum L.	Pentstemon atropurpureus Don.
— crithmifolia JV.	Leucas martinicensis Br.	Milleria biflora L.	— congestus B. R.
— pasilla L.	Leyssera gnaphaloides L.	Mimulus floribundus B. R.	— diffusus Dougl.
Heracleum angustifolium L.	Ligusticum alatum Sp.	— luteus L.	— Digitalis Nutt.
— pyrenaicum Lam.	— longifolium JV.	— moschatus Dougl.	Peucedanum austriacum M. K.
Hermaea flammæa Jacq.	— pyrenaicum Gou.	Moluccella laevis L.	— longifolium JV. K.
Heuchera villosa Mx.	Libanotis buchtormiensis D. C.	Monarda Kalmiana Ph.	— parviflora M. K.
Hibiscus longifolius JV.	— condensata (Athamanta L.)	Monolepis trifida Schrd.	Phyteuma betonicæfolium Vill.
Hieracium foliosum JV. K.	Linaria triphylla Desf.	Moscharia rosea H. P.	— orbiculare L.
— humile Host.	Lippia dulcis *	Myoporum oppositifolium Br.	— Scheuchzeri Vill.
— pyrenaicum L.	Lithospermum clandestinum * ⑨)	Nasturtium erectum * ⑪)	— virgatum JV.
— saxatile Jacq.	— flavescens Mey. *	— pyrenaicum Br.	
— undulatum JV. K.	— latifolium Mx.		
Hippocrepis biflora Sp.			
— multisiliquosa L.			

5) Glabriuscule; fol. linearibus oppositis, floralibus pinnatidis spinosis; roribus glomeratis; calyc. multifidis. ⑥). Proxime accedit ad G. pungetum Dougl. (B. M. t. 2777), sed differt vestitu; foliis, calyce et corolla. Semina ad Casablanca in regno Chilensi lecta. T.

6) (Argyrocomum) erectum viscoso-pubescent; fol. lanceolatis semiocurrentibus crisps; calycibus ovatis corymbosis lateralibus terminalibusque. ⑦).

7) Planta fructifera ab affin. H. albo recedit foliis superioribus integerrimis, calycis facialis multo latioribus patentibus. Corolla in utraque specie maculata. N. ab E.

8) Diffusum hispidum; fol. lanceolatis amplexicaulis; calycib. subsessilibus ventricosis corollam excedentibus; semina granulatis. ⑧). Corolla alba, tubo ventricoso, limbis tacit. conniventibus. Semina duo plerumque abortunt. T.

9) Cfr. Pl. Itin. causer. Esp. 98. A L. orientali L. differt aera duratione, calycibus diffusis, corolla calycem sequante. T.

10) Prostrata ramosissima; fol. cuneato-lanceolatis dentatis; spicis erctis; leguminibus subrotundis reticulato-rogosis. ⑩). A M. parviflora, cui proxima, differt caule prostrato; legum inibus reticulatis. N. semina. Chilensis. T.

11) Erectum glaberrimum; fol. pinnatifidis angulis; petalis integris calycem subexcedentibus; siliques verticibus patentibus. ⑪). Semina ex horto bo. Tauri, sub nomine Cardamines Iacelidae Cham. missa. — Flores albi: Stigma sessile integrum. Siliques semipollicares brevissime pedunculatae,