

Classis V.

PENTANDRIA

MONOGYNIA.

HELIOTROPIUM.

- indicum.* 1. HELIOTROPIUM foliis cordato-ovatis acutis scabriusculis, spicis solitariis, fructibus bifidis. *Fl. zeyl.* 70.
 Heliotropium foliis ovatis acutis, spicis solitariis. *Hort. cliff.* 45. *Roy. lugdb.* 405.
 Heliotropium americanum cæruleum. *Dod. mem.* 83. *Pluk. phyt.* 245. f. 4.
- β. Heliotropium americanum cæruleum, foliis hormini angustioribus. *Herm. lugdb.* 307. *Sloan. jam.* 98.
Habitat in India utraque. ☉
- europæum.* 2. HELIOTROPIUM foliis ovatis integerrimis tomentosis rugosis, spicis conjugatis. *Hort. ups.* 33. *Sauv. monsp.* 305.
 Heliotropium foliis ovatis integerrimis, spicis conjunctis. *Hort. cliff.* 45. *Roy. lugdb.* 404.
 Heliotropium majus dioscoridis. *Bauh. pin.* 253.
Habitat in Europa australi. ☉
- supinum.* 3. HELIOTROPIUM foliis ovatis integerrimis tomentosis plicatis, spicis solitariis,
 Heliotropium minus supinum. *Bauh. pin.* 253.
 Heliotropium supinum. *Clus. hist.* 2. p. 47.
Habitat Salmanticæ juxta agros, Monspelii in litore. ☉
- curassavicum* 4. HELIOTROPIUM foliis lanceolato-linearibus glabris aveniis, spicis conjugatis, *Hort. cliff.* 45. *Hort. ups.* 33. *Roy. lugdb.* 405. *Dalib. paris.* 57.
 Heliotropium indicum procumbens glaucophyllum, floribus albis. *Pluk. alm.* 182. t. 36. f. 3.
 Heliotropium maritimum minus, folio glauco, flore albo. *Sloan. hist.* 1. p. 213. t. 132. f. 3.
 Heliotropium curassavicum, foliis lini umbilicati. *Morif. hist.* 3. p. 452. f. 11. t. 31. f. 12.
 Heliotropium americanum procumbens, facie lini umbilicati. *Herm. par.* 183. t. 183.
Habitat in Americæ calidioris maritimis. ☉

5. HELIOTROPIUM foliis linearibus glabris aveniis, orientate.
floribus sparsis lateralibus.

Habitat in Asia. ☉

Planta parva, procumbens, repens. Folia linearia, alterna. Flores subsessiles, alterni, solitarii, inter folia sparsi.

MYOSOTIS.

1. MYOSOTIS feminibus nudis: foliorum apicibus callosis. *Vir. cliff.* 149. *Fl. suec.* 149. *Roy. lugdb.* 404. *Hort. cliff.* 45. *scorpioides.*

a. Myosotis foliis hirsutis. *Hort. cliff.* 46. *arvensis.*

Myosotis hirsuta arvensis major. *Dill. giss.* 55. *Fl. lapp.* 74.

Echium scorpioides arvense. *Bauh. pin.* 254.

β. Myosotis foliis glabris. *Hort. cliff.* 46. *Dalib. paris.* 58. *palustris.*

Myosotis glabra pratensis. *Dill. giss.* 67. *Fl. lapp.* 75.

Echium scorpioides palustre. *Bauh. pin.* 254.

Habitat in Europæ a campis aridis & β aquosis scaturiginosis. ☉

2. MYOSOTIS feminibus aculeatis glochidibus, foliis ovato-oblongis, ramis divaricatis. *virginiana.*

Myosotis feminibus hispida, foliis lanceolato-ovatis.

Gron. virg. 19.

Cynoglossum virginianum, flore & fructu minimo. *Pluk. alm.* 126.

Habitat in Virginia. ☉

Semina interiori latere nuda, angulata, erecta, basi affixa, ut in sequenti, fructus nutans.

3. MYOSOTIS feminibus aculeis glochidibus, foliis lanceolatis pilosis. *Fl. suec.* 150. *Dalib. paris.* 57. *Lappula.*

Lithospermum feminibus echinatis. *Hort. cliff.* 46. *Roy. lugdb.* 405.

Cynoglossum folis lanceolatis, floribus in foliorum alis subsessilibus. *Guett. stamp.* 1. p. 92.

Cynoglossum minus. *Bauh. pin.* 257.

Habitat in Europæ argillosis, nudis, ruderatis. ☉

4. MYOSOTIS feminibus nudis, foliis hispida, racemis foliosis. *apula.*

Lithospermum feminibus lævibus, corollis vix calycem superantibus, foliis lanceolatis. *Roy. lugdb.* 405. *Sauv. monsp.* 62.

Echium luteum minimum. *Bauh. pin.* 255.